

FERTILEADER[®] Vital

Výrobce: Timac Agro S.A.S. 27 avenue Franklin Roosevelt, BP 70158, 35408 Saint-Malo, France

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 - Strašnice;
registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995

číslo rozhodnutí o registraci: 2514

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Celkový dusík (N)	9 %
Močovinový dusík (N)	9 %
Vodorozpustný oxid fosforečný (P ₂ O ₅)	5 %
Vodorozpustný oxid draselný (K ₂ O)	4 %
Vodorozpustný bor (B)	0,05 %
Vodorozpustná měď (Cu)	0,02 %
Vodorozpustné železo (Fe)	0,02 %
Vodorozpustný mangan (Mn)	0,10 %
Vodorozpustný molybden (Mo)	0,01 %
Vodorozpustný zinek (Zn)	0,05 %
pH	5 – 6

Hnojivo obsahuje stimulant biologických procesů Seactiv[®] komplex (výtažek z mořských řas, rostlinné výtažky) .

Hnojivo s nízkým obsahem chloru.

Obsah rizikových prvků:

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se používá ve formě postřiku. V zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví a okrasném zahradnictví je nejvhodnější pravidelné přihnojování postřikem vícekrát za vegetaci v intervalu 10-14 dní. Přihnojovat začínáme po vytvoření dostatečné listové plochy. Hnojení končíme 2-3 týdny před sběrem. Ve vytrvalých kulturách končíme s hnojením v červenci-srpnu. Postřik provádíme časně ráno nebo v podvečer.

Plodina	Počet aplikací	Aplikace ve vývojovém stadiu	Dávka l / ha	Ředění
Obilniny	1-2	Vlajkový list plně rozevřený, objevení se jazýčku posledního listu	3	150-500
Vinohrady	4-6	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Sady	4-6	Začátek růstu plodů Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000

Rajčata, Lilek, Okurky Cukety, Sladká paprika, Melouny	4-8	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Salát, čekanka	4-8	4 listů Každých 15 dní	3 3	400-1000 400-1000
Cibule, Česnek, Květák, Jahody	4-8	Vývoj rostlin Každých 15 dní	5 5	400-1000 400-1000
Řepka ozimá	1-2	Opad korunních lístků	4	150-500
Kukuřice	1-2	6-8 listů	4	150-500

Toto doporučení je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stádiu plodiny, půdnímu druhu a povětrnostním podmínkám.

Ředění: Nalijte FERTILEADER Vital do nádrže aplikačního zařízení z poloviny naplněného vodou a dobře promíchejte. Poté doplňte nádrž postřikovače vodou na stanovený objem. Míchejte během celé aplikace. Doporučené minimální ředění je 150 l/ha. Před použitím protřepat. Neaplikujte v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer.

Mísitelnost: FERTILEADER Vital je kompatibilní s mnoha chemickými látkami. V každém případě snášlivost před použitím vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složení výrobku uvedeného na etiketě v originálním balení.

Podmínky skladování:

Minimální skladovací teplota: 0 °C

Číslo výrobní šarže: na obalu

Datum výroby: na obalu

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Hustota: 1,16

Netto hmotnost: 11,6 kg

Netto Objem: 10 l

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

FERTILEADER® Vital

Varování



H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P337 +P313: Přetrvává-li podráždění očí:

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.