

## FERTIACTYL RADICAL

**Výrobce:** Timac Agro España S.A. - Polígono Arazuri-Orcoyen - Calle C, n°32 - ORCOYEN (NAVARRA), 31160 ESPAÑA – Tel: + 34 948 324 500  
**Dovozce:** TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 - Strašnice; registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995

**Evidenční číslo vzájemného uznání: V817**

### Kapalná směs mikroživin (Bor (B), Mangan (Mn))

#### Chemické a fyzikální vlastnosti:

ve vodě rozpustný bor (B)	9,2 %
ve vodě rozpustný mangan (Mn) (chelát EDTA)	0,4 %
Hodnota pH	7,7 – 9,7
Stabilita chelátové frakce	pH od 3,0 do 10,0

Obsahuje: FERTIACTYL – stimulant růstu a vývoje rostlin

#### Účinky na plodiny:

- Zvětšení kořenové hmoty a podpora vývoje kořenových vlásků
- Lepší růst rostlin a akumulace biomasy díky intenzivnější fotosyntéze
- Zvýšená absorpce živin

**Obsah rizikových prvků** splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

#### Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá ve formě postřiku. Před použitím dobře protřepejte. Nestříkejte při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách stříkejte na začátku dne nebo večer.

U všech plodin napomáhá počátečnímu vývoji, posiluje a zvyšuje odolnost vůči abiotickému stresu a urychluje regenerační procesy.

#### Doporučené dávkování

Plodiny	Počet aplikací za rok	Aplikace ve vývojovém stádiu	Doporučené dávkování (l/ha)	Ředění (l/ha)
Cukrová řepa	1-2	Od 4-tého listu	3	200 - 1000
Kukuřice	1-2	Od 4-tého listu	3	200 - 1000
Brambory	1-2	100% při vzcházení nebo 90 % při vzejití 1. dávka 2. dávka po 15 dnech	3	200 - 1000
Fazole, sója, luštěniny	1-2	5 cm	3	200 - 1000
Řepka	1-2	Od 4-tého listu	3	200 - 1000
Zelenina	1-2	Po výsadbě / mladé rostliny Nebo po přesazení / mladé rostliny 2. dávka po 15 dnech	3	400 - 1000
Ozimé obiloviny	1-2	3 listy / odnožování	3	200 - 1000

Uvedené dávky jsou orientační. Nepřekračujte doporučené dávky. Dávky by měly být stanoveny v závislosti na stavu rostlin, typu půdy a klimatických podmínkách.

**ŘEDĚNÍ:** Postřikovač opláchněte, naplňte do poloviny vodou, přidejte FERTIACTYL RADICAL a zapněte míchadlo. Roztok by měl být míchán až do konce ošetření. Minimální množství ředící vody je 200 l / ha. Před použitím dobře protřepejte. Nestříkejte při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách stříkejte na začátku dne nebo večer.

**MÍSITELNOST:** FERTIACTYL Radical je kompatibilní s většinou produktů, kromě produktů s kyselým pH, produktů obsahujících oleje, minerály nebo produktů bohatých na vápník nebo hořčík. Doporučuje se pokaždé provést počáteční test mísitelnosti. Odpovědnost výrobce je výslovně omezena na zaručení kvality výrobku v původním obalu.

**SKLADOVÁNÍ:** Výrobky neskladujte při teplotách pod 0 °C, chraňte před mrazem.

Hustota: 1.36      Netto váha: \_\_ kg      Netto objem: \_\_ L

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby      Datum výroby: na obalu

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:**



P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodou.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy pro sběr nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.